

ビカルタミド錠 80mg「オール」

を服用される患者様へ

どんなお薬ですか？

○このお薬は、男性ホルモン（テストステロン等）の受容体結合を阻害することで男性ホルモンの働きを抑えて、前立腺腫瘍の細胞増殖を抑えます。

服用方法は？

○このお薬は白色の錠剤です。主治医の指示に従い、**1回1錠を1日1回決められた時間に服用してください**。お薬はPTPシートから取り出し、コップ一杯の水（又はぬるま湯）で飲んでください。

飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。

ただし、次に飲む時間が近い場合は、1回分を飛ばして次の通常の服用時間に1回分を服用してください。**絶対に2回分を一度に服用しないでください。**

誤って多く服用したときは、すぐに主治医又は薬剤師に相談してください。

主治医の指示なしに自分の判断で服用をやめないでください。

副作用は？

○主な副作用として、乳房腫脹、乳房圧痛、顔や体のほてり、勃起力低下、AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇、Al-P 上昇、 γ -GTP 上昇、LDH 上昇、総コレステロール上昇などが報告されています。

気になる症状があらわれたときには、医師または薬剤師に相談してください。

<特に注意すべき副作用>

- (1) 全身倦怠感、かゆみ、吐き気、食欲不振、発熱、発疹、皮膚や白目が黄色くなる **【劇症肝炎、肝機能障害、黄疸】**
- (2) のどの痛み、発熱、歯ぐきや鼻など皮下・粘膜下から出血しやすい、手足に点状出血・あおあざがしやすい **【白血球減少、血小板減少】**
- (3) 息切れ、息苦しい（呼吸困難）、から咳、発熱 **【間質性肺炎】**
- (4) 急激な胸の痛みや圧迫感を感じる、冷や汗が出る、からだがだるい、息切れがする、足がむくむ **【心筋梗塞、心不全】**

服用時に注意することは？



次のような方は服用する前に主治医に相談してください。

- 以前に薬を飲んで、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある方。
肝障害がある方。
- 他に薬を飲んでいる場合は、薬局で買った薬も含めてその薬についても主治医にお伝えください。
- 他の医療機関を受診する場合や薬局で薬を買う場合、ビカルタミド錠80mg「オーハラ」を服用していることをお伝えください。

保管方法は？

- 直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 乳幼児、小児の手の届かないところで保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局に相談してください。

薬の名前、剤形、有効成分など

製品名	ビカルタミド錠80mg「オーハラ」
成分名	ビカルタミド
外観	表面 裏面  (実物大) 
剤形	白色のフィルムコーティング錠
識別番号	ビカルタミド 80 オーハラ

2013年9月改訂AH