

# くすりのしおり

内服剤

2024 年 09 月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 製品名：ベラプロスト Na 錠 20 $\mu$ g「オーハラ」

主成分：ベラプロストナトリウム (Beraprost sodium)

剤形：白色～淡黄白色の錠剤、直径 6.1mm、厚さ 2.7mm

シート記載など：ベラプロスト Na20  $\mu$ g「オーハラ」、20  $\mu$ g、Beraprost Na 20  $\mu$ g「OHARA」



## この薬の作用と効果について

血小板および血管平滑筋のプロスタグランジン  $I_2$  受容体に結合し、血を固まりにくくし血管を拡張して血液の流れを良くします。

通常、慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善や原発性肺高血圧症に用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。出血している（血友病、毛細血管脆弱症、上部消化管出血、尿路出血、喀血、眼底出血など）。
- ・妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（（ ）：医療担当者記入）
- ・慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛および冷感の改善：通常、成人は1回2錠（主成分として40  $\mu$ g）を1日3回食後に服用します。  
原発性肺高血圧症：通常、成人は1回1錠（主成分として20  $\mu$ g）を1日3回食後に服用します。症状をみながら徐々に増量されます。増量する場合は服用回数を1日3～4回、最高用量を1日9錠（180  $\mu$ g）とされます。  
いずれの場合も、必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・意識障害などがあらわれることがあるので、自動車の運転など、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、頭痛、顔面潮紅、ほてり、吐き気、下痢、出血傾向、皮下出血、鼻出血、貧血、発疹、湿疹、かゆみ、蕁麻疹、紅斑などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・頭痛、吐血・下血、視力低下 [出血傾向（脳出血、消化管出血、肺出血、眼底出血）]
- ・めまい、顔面蒼白、吐き気 [ショック、失神、意識消失]
- ・発熱、から咳、呼吸困難 [間質性肺炎]
- ・全身けん怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる [肝機能障害]
- ・胸がしめつけられるように痛い、圧迫感、冷汗 [狭心症、心筋梗塞]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

