

# くすりのしおり

内服剤

2020年10月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：ニフプラス配合内用剤

**主成分：**塩化ナトリウム (Sodium chloride)  
塩化カリウム (Potassium chloride)  
炭酸水素ナトリウム (Sodium bicarbonate)  
無水硫酸ナトリウム (Anhydrous sodium sulfate)



**剤形：**白色の散剤

**シート記載：**経口腸管洗浄剤、ニフプラス配合内用剤、NIFPLUS、137.155g

## この薬の作用と効果について

内服の腸管洗浄剤であり、水様便を排泄することによって腸管の内容物の排除・洗浄効果を示します。通常、大腸内視鏡検査、バリウム注腸 X 線造影検査および大腸手術時の前処置における腸管内用物の排除に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。胃腸管閉塞症、腸閉塞の疑い、腸管穿孔、中毒性巨大結腸症、便秘、腹部手術後、狭心症、心筋梗塞、腎障害、糖尿病
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（（ ）：医療担当者記入）
- ・1袋を水で溶かし約2Lの溶解液とします。通常、成人は1回2～4Lを1時間あたり約1Lの速度で服用します。ただし、排液が透明になった時点で服用を終了します。4Lを超えることはありません。必ず指示された溶かし方、飲み方に従ってください。
- ・飲んでる時に腹痛、吐き気、嘔吐、顔が青ざめる、めまいなどがあらわれた場合には、飲むのを中止し、直ちに医師または薬剤師に連絡してください。飲み終わったのちにこれらの症状があらわれた場合にも、直ちに医師または薬剤師に連絡してください。2Lを飲んででも排便がない場合には、飲むのを中止し、医師に連絡してください。自宅で飲む場合は、副作用があらわれた時の対応がとれるよう付き添い人のいる場所で飲んでください。
- ・バリウム注腸 X 線造影検査の際には、本溶解液を服用する前後にモサプリドクエン酸塩 20mg を服用します。
- ・飲み忘れた場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、腹部膨満感、嘔気、腹痛、冷感、けん怠感、ふらつき感、嘔吐などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・息苦しい、顔面蒼白、意識がもうろうとする [ショック、アナフィラキシー]
- ・腹痛、腹部膨満感、嘔吐 [腸管穿孔、腸閉塞、単径ヘルニア嵌頓]
- ・意識がもうろうとする、けいれん、嘔吐 [低ナトリウム血症]
- ・腹痛、腹部膨満感、血便 [虚血性大腸炎]
- ・嘔気、嘔吐、血便 [マロリー・ワイス症候群]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温を避けて保管してください。
- ・指示された時間に服用しますが、事前に溶解した場合には、冷蔵庫内に保存し、48時間以内に飲んでください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

SI②