


くすりのしおり

620882224

2012年12月作成

<p>薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。</p>	
<p>商品名:カモスタットメシル酸塩錠 100mg「オーハラ」 主成分:カモスタットメシル酸塩(Camostat mesilate) 剤形:白色～帯黄白色の錠剤、直径6.6mm、厚さ4.2mm シート記載:カモスタットメシル酸塩 100mg「オーハラ」、OH-241、100mg、Camostat Mesilate 100mg「OHARA」</p>	
<p>この薬の作用と効果について 膵液中に含まれている蛋白を分解する酵素（トリプシン）が膵臓内で異常に活発になっているのを抑えて、膵臓の組織がこわれるのを防ぎ、膵臓の炎症や痛みを和らげます。また、十二指腸液の食道への逆流によって生じる胸焼け、胸の痛みなどを改善します。 通常、慢性膵炎における急性症状の緩解、術後逆流性食道炎の治療に用いられます。</p>	
<p>次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。・妊娠または授乳中・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。	
<p>用法・用量（この薬の使い方）</p> <ul style="list-style-type: none">・あなたの用法・用量は<< :医療担当者記入>>・慢性膵炎：通常、1回2錠（主成分として200mg）を1日3回服用しますが、症状により適宜増減されません。 術後逆流性食道炎：通常、1回1錠（主成分として100mg）を1日3回食後に服用します。 いずれの場合も、必ず指示された服用方法に従ってください。・飲み忘れた場合は気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は忘れた分は飲まないで1回分は飛ばしてください。2回分を一度に飲んではいけません。・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。	
<p>生活上の注意</p>	
<p>この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、発疹、かゆみ、嘔気、腹部不快感、腹部膨満感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・血圧低下、呼吸困難、かゆみ [ショック、アナフィラキシー様症状]・鼻血、歯ぐきの出血、四肢などの皮下出血 [血小板減少]・全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる [肝機能障害、黄疸]・手足や唇のしびれ、筋肉に力が入らない、手足の麻痺 [高カリウム血症] <p>以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。</p>	
<p>保管方法 その他</p> <ul style="list-style-type: none">・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。	
<p>医療担当者記入欄 年 月 日</p>	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。