

## くすりのしおり

2013年6月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力がが必要です。

### 商品名：リシノプリル錠 10mg「オーハラ」

**主成分：**リシノプリル水和物 (Lisinopril hydrate)

**剤形：**白色の割線入り蝶型錠剤、長径 9.3mm、短径 5.6mm、厚さ 3.3mm

**シート記載：**リシノプリル「オーハラ」、10mg、Lisinopril 10mg「OHARA」、リシノプリル 10mg「オーハラ」、リシノプリル、OH-77、高血圧・慢性心不全のお薬です



### この薬の作用と効果について

アンジオテンシン変換酵素を阻害してアンジオテンシン II の生成を抑えることで、血管を拡張し、血圧を下げ、心臓の負担を軽減します。

通常、高血圧症や慢性心不全（軽症～中等症）の治療に用いられます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。血管浮腫の既往歴、アフェレーシスを施行中、血液透析施行中、腎動脈狭窄、高カリウム血症、腎機能障害、脳血管障害がある。
- ・妊娠、妊娠している可能性があるまたは授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

・ **あなたの用法・用量は** <<< :医療担当者記入>>

・ **高血圧症：**通常、成人は1回1～2錠（主成分無水物として10～20mg）を1日1回服用します。年齢・症状により適宜増減されますが、重症高血圧症や腎障害を伴う高血圧では1回1/2錠（5mg）を1日1回服用から開始される場合があります。通常、6歳以上の小児は、1回主成分無水物として0.07mg/kgを1日1回服用します。年齢・症状により適宜増減されますが、1日20mgを超えることはありません。本剤は1錠中に主成分無水物として10mgを含有します。

**慢性心不全（軽症～中等症）：**本剤はジギタリス製剤、利尿剤などの基礎治療剤と併用されます。通常、成人は1回1/2～1錠（主成分無水物として5～10mg）を1日1回服用します。年齢・症状により適宜増減されますが、腎障害を伴う場合は1回主成分無水物として2.5mgを1日1回服用から開始される場合があります。

いずれの場合も、必ず指示された服用方法に従ってください。

- ・ 飲み忘れた場合は気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、飲み忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

### 生活上の注意

- ・ 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがありますので、高いところでの作業や自動車の運転など危険を伴う機械を操作するときには注意してください。

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、から咳、発疹、かゆみ、光線過敏症などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 呼吸困難を伴う顔面・舌・声門・喉頭の腫張、腹痛、吐き気 [血管浮腫]
- ・ 尿量減少、むくみ、のどの渇き [急性腎不全]
- ・ 手足や唇のしびれ、筋肉減退、手足の麻痺 [高カリウム血症]
- ・ 上腹部・腰背部の痛み、発熱、吐き気 [膵炎]
- ・ 38℃以上の高熱、紅斑・水ぶくれ、口唇・眼粘膜のただれ [中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、天疱瘡様症状]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**保管方法 その他**

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

**医療担当者記入欄**

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

SI②