

くすりのしおり

2013年6月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ニトレンジピン錠 5mg「オーハラ」

主成分：ニトレンジピン（Nitrendipine）

剤形：淡黄白色の錠剤、直径：6.2mm、厚さ：3.1mm

シート記載：ニトレンジピン 5mg「オーハラ」、ニトレンジピン、5mg、Nitrendipine 5mg「OHARA」、ニトレンジピン「オーハラ」、
高血圧、狭心症治療のお薬です



この薬の作用と効果について

カルシウム拮抗剤で、細胞内へのカルシウムイオンの流入を減少させ、末梢血管や冠血管を拡げて降圧作用や抗狭心症作用を示します。

通常、高血圧症、腎実質性高血圧症、狭心症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。血圧が低い、肝機能障害、腎機能障害がある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << >> **：医療担当者記入**
- ・ 高血圧症、腎実質性高血圧症：通常、成人は1回1～2錠（主成分として5～10mg）を1日1回服用します。
狭心症：通常、成人は1回2錠（主成分として10mg）を1日1回服用します。
いずれの場合も、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ 降圧作用に基づくめまいなどがあらわれることがありますので、高いところでの作業や自動車の運転など危険を伴う操作には十分注意してください。
- ・ グレープフルーツジュースの成分で薬の作用が増強するおそれがありますので、グレープフルーツジュースと同時に服用しないでください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、頭痛、顔面潮紅、動悸、ほてり、めまい、胸部痛、発疹、光線過敏症、そう痒感、歯肉肥厚などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 意識消失、呼吸減弱、顔面蒼白 [ショック様症状]
- ・ 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる [肝機能障害、黄疸]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

※次ページも必ずお読みください。

ニトレジック錠 5mg

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

SI①