

くすりのしおり

内服剤

2017年08月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：プラバスタチンNa錠10mg「オーハラ」

主成分：プラバスタチンナトリウム(Pravastatin sodium)

剤形：微紅色の片面割線入り錠剤、直径7.5mm、厚さ2.4mm

シート記載：プラバスタチンNa10mg「オーハラ」、10mg、Pravastatin Na 10mg「OHARA」



この薬の作用と効果について

肝臓のコレステロール合成酵素の働きを抑えて、肝臓内コレステロールを低下させることによって、血中コレステロールが肝臓内に取り込まれ、血中コレステロールを低下させます。

通常、高脂血症、家族性高コレステロール血症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝障害、腎障害がある。
- 妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- あなたの用法・用量は((:医療担当者記入))
- 通常、成人は1日1錠（主成分として10mg）を1日1回または2回に分けて服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。重症の場合は、1日2錠（20mg）まで増量される場合もあります。必ず指示された服用方法に従ってください。
 - 飲み忘れた場合は気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は忘れた分は飲まないで1回分は飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
 - 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
 - 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- 指示された食事療法や運動療法をきちんと守ってください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、胃不快感、下痢、湿疹、じんましん、かゆみ、紅斑、脱毛、光線過敏、貧血などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 筋肉痛、脱力感、赤褐色尿〔横紋筋融解症、ミオパチー〕
- 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目などが黄色くなる〔肝障害〕
- 鼻血、歯ぐきの出血、四肢などの皮下出血〔血小板減少〕
- 発熱、から咳、呼吸困難〔間質性肺炎〕
- 皮膚の広い範囲が赤くなる、38度以上の高熱、全身倦怠感〔過敏症状〕

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年　月　日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

SI②