


くすりのしおり

620260002

2014年02月改訂

<p>薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。</p>	
<p>商品名:プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」 主成分:プロパフェノン塩酸塩(Propafenone hydrochloride) 剤形:白色の錠剤、直径8.1mm、厚さ3.7mm シート記載:プロパフェノン塩酸塩 150mg「オーハラ」、プロパフェノン、150mg、OH-141、不整脈治療剤、Propafenone Hydrochloride150mg「OHARA」</p>	
<p>この薬の作用と効果について 心筋のNaチャネル抑制作用により、活動電位持続時間を延長して心臓のリズムを正常にします。通常、頻脈性不整脈の治療に用いられます。</p>	
<p>次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。うっ血性心不全、房室ブロック、洞房ブロックがある。 ・妊娠または授乳中 ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。 	
<p>用法・用量（この薬の使い方）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あなたの用法・用量は<< :医療担当者記入>> ・通常、成人は1回1錠（主成分として150mg）を1日3回服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。 ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。 ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 	
<p>生活上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ・セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）含有食品は薬の作用を弱める可能性があるため、摂取を避けてください。 ・めまいなどがあらわれることがあるので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。 	
<p>この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、めまい・ふらつき、動悸、胸痛、黄疸、けん怠感、発疹、かゆみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・動悸、胸痛、めまい [心室頻拍、心室細動、洞停止、洞房ブロック、房室ブロック、徐脈、失神] ・吐き気、食欲不振、けん怠感 [肝機能障害、黄疸] <p>以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。</p>	
<p>保管方法 その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿度を避けて保管してください。 ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。 	
<p>医療担当者記入欄</p>	<p>年 月 日</p>

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。