

くすりのしおり

620006945

2011年6月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
商品名：スパカール細粒 10% 主成分：トレピブトン（Trepibutone） 剤形：白色～帯黄白色の細粒 シート記載：	
この薬の作用と効果について 胆汁・膵液の分泌を促進するほか、消化管の平滑筋（オッジ括約筋など）の弛緩を促進し、胆のう・胆管の内圧を低下させ、胆道・膵疾患の症状を改善します。 通常、胆石症・胆のう炎・胆管炎・胆道ジスキネジー・胆のう切除後症候群に伴う鎮痙・利胆、慢性膵炎に伴う疼痛や胃腸症状の改善に使用されます。	
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 <ul style="list-style-type: none">・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。・ 妊娠または授乳中・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。	
用法・用量（この薬の使い方） <ul style="list-style-type: none">・ あなたの用法・用量は ：医療担当者記入・ 通常、成人は1回0.4g（主成分として40mg）を1日3回食後直ちに服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。・ 飲み忘れた場合は気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は忘れた分は飲まないで1回分は飛ばしてください。2回分を一度に飲んではいけません。・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。	
生活上の注意	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、吐き気、便秘、膨満感、下痢、発疹、かゆみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 該当する記載事項はありません。 以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。	
保管方法その他 <ul style="list-style-type: none">・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。	
医療担当者記入欄 年 月 日	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。