

くすりのしおり

内服剤

2016年03月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」

主成分：タムスロシン塩酸塩(Tamsulosin hydrochloride)

剤形：ごくうすい赤色/白色の不透明なカプセル剤、長径14.2mm、短径5.3mm

シート記載：タムスロシン塩酸塩0.2mg「オーハラ」、0.2mg、前立腺肥大症の排尿障害改善剤です、Tamsulosin Hydrochloride 0.2mg「OHARA」



この薬の作用と効果について

尿道や前立腺部の α_1 受容体遮断により尿路平滑筋を弛緩し、尿道内圧を下げて尿を出やすくします。通常、前立腺肥大症に伴う排尿障害の改善に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。起立性低血圧、肝機能障害、腎機能障害がある。
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<< :医療担当者記入>>
- ・通常、成人は1回1カプセル（主成分として0.2mg）を1日1回食後に服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・めまいなどがあらわれることがありますので、高いところでの作業や自動車の運転など危険を伴う操作には十分注意してください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、めまい、胃不快感、かゆみ、発疹、じんましん、多形紅斑などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・気を失う、意識がなくなる [失神・意識喪失]
- ・全身けん怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる [肝機能障害、黄疸]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

SI②