セレコキシフ錠100mg オーバラ。 セレコキシフ錠200mg オーバラを

服用される患者様へ

セレコキシブ錠「オーハラ」は 関節、筋肉などの腫れや痛みを抑え、 日常生活を過ごしやすくするお薬です。

●服用時の注意とお願い

- ○錠剤を包装シートから取り出し、コップ1杯 の水またはぬるま湯で飲んでください。
- ○通常、朝食後、夕食後の1日2回、飲んでください。 さい。(医師の指示通り服用してください。)
- ○ご自身の判断で、お薬の量を増減しないでください。
- ○飲み忘れた際は、出来るだけ早く1回分を服用してください。 但し次の回が近い場合には、1回分をとばしてください。 そして次の回に1回分のみ服用してください。
- ○腫れや痛みが治まったら、医師に相談してください。(ご自身の判断で、服用を中止しないでください。)
- ○2~4週間飲み続けても、腫れや痛みが取れ ない場合は、医師に相談してください。

●おもな副作用

○腹痛・下痢、吐き気 ○□内炎 ○発疹



次の症状がでたら、すぐに服用を中止し、医師に相談してください。

- ○息苦しい、急激に胸を強く押さえつけられた感じ、狭心痛、冷 や汗、手足のまひ・しびれ、片側のまひ、しゃべりにくい等。
- ・上記以外でも、気になる症状があらわれた場合には、医師また は薬剤師に速やかに相談してください。

●保管方法・その他

- ○直射日光をさけ、室温 (1~30°C) で保管してしてください。 又、乳幼児・小児の手に届かないところに 保管してください。
- ○薬が余った(残った)場合は、絶対に 他の人に渡さないでください。
- ○薬が余った(残った)場合は、医師や 薬剤師に相談してください。



