


「うつ病・うつ状態」で デュロキセチン「オーハラ」 を服用される方とそのご家族へ

服用する時の注意点

少量からはじめ、徐々に増やしていきます。

デュロキセチン「オーハラ」の服用量を治療に最適な量になるように調節したり、副作用を軽減したりするために徐々に増やしていきます。



効果があらわれるまでに
時間がかかります。

効果があらわれるまで2～4週間かかる場合もあります。すぐに効果があらわれなくても継続して服用してください。



大原薬品工業株式会社

- 1日1回朝食後にお飲みください。
- カプセルをあけたり噛んだりせず、そのまま服用してください。
- 医師または薬剤師から指示された服用量をお守りください。医師の指示なしに自分の判断で服用を止めないでください。
- 飲み忘れた場合は、出来るだけ早く1回分を服用してください。ただし、次に飲む時間が近いときは1回とばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 自動車の運転などをする場合は、医師に相談してください。眠気、めまいなど、自動車の運転に影響を与える症状があらわれることがあるので、注意してください。またこれらの体調不良を自覚した場合は、絶対に運転しないでください。特に薬の飲み始め、飲む量を変えたとき、他の薬から変えた際にこれらの症状があらわれやすいため、医師より運転などをしないように指示があった場合は指示を守りましょう。
- アルコールは薬の作用や副作用を強めることがあるので、注意してください。
- 薬の服用中に何か気になることがある場合は、医師または薬剤師へ速やかにご相談ください。

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

【ご家族の方へ】

患者さんに自殺念慮、攻撃性などの行動の変化やうつ病、うつ状態の悪化があらわれた場合には、医師と緊密に連絡を取り合ってください。

	デュロキセチンカプセル 20mg「オーハラ」	デュロキセチンカプセル 30mg「オーハラ」
剤形 (実物大)	  表面 裏面	  表面 裏面
包装シート	  表面 裏面	  表面 裏面