

イマチニブ錠100mg「オハラ」を

服用される患者様へ

このお薬を正しく服用するため、
飲む前に必ずお読みください。

● 服用量および服用回数

服用量や服用回数は、患者様によって異なる場合がありますので、医師の指示に従ってください。



● 服用時のお願い

多め(200mL程度)の水またはぬるま湯で食後に飲んでください。グレープフルーツジュースは、この薬の作用を強くすることがありますので、一緒に飲まないでください。

● 服用後の注意

めまい、眠気、目のかすみなどが起こることがあります。車の運転・危険を伴う機械の操作をする際は、注意してください。

● 飲み忘れた場合

決して2回分を一度に飲まないでください。飲み忘れた分は飲まずに、次の決められた時間に決められた量のみ飲んでください。



慢性骨髄性白血病に関する情報サイト
<https://cml.ohara-ch.co.jp/>



副作用

吐き気・嘔吐、下痢、むくみ、発疹、筋肉痛・けいれん、発熱・感染症などの症状があらわれることがあります。上記以外でも気になる症状があらわれたときは、医師または薬剤師に速やかに相談してください。また、お薬のことや、病気そのものについてわからないことや、不安に思うことがあれば、医師や薬剤師に相談してください。

その他の注意

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。また、乳幼児・小児の手の届かないところに保管してください。



保管方法

薬が余った（残った）場合は、絶対に他の人に渡さないでください。薬が余った（残った）場合は、医師や薬剤師に相談してください。

薬の名前、剤形

製品名	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	
外 観	表面	裏面
	 (実物大)	
		



大原薬品工業株式会社