

オランザピン錠 2.5mg, 5mg, 10mg「オーハラ」、 オランザピン細粒 1%「オーハラ」を

服用される患者さまとご家族の方へ

**このお薬を安全に使っていただくための、大切なお知らせです。
服用していただく前に、裏面の注意事項も必ずお読みください。**

このお薬は、強い不安感やイライラする症状を改善し、気分を安定させるはたらきがあります。

一方では、服薬中に以下のような高血糖の症状があらわれる場合があります。

- ・急に体重が減ってきた。
- ・激しいのどのかわき。水やジュースをたくさん飲む。
- ・何回もトイレに行きたくなる。おしっこが多くなる。

これらの症状があらわれた場合、すぐに主治医の先生に連絡し、診察を受けてください。

主治医または薬剤師への連絡先



オランザピン錠「オーハラ」、オランザピン細粒「オーハラ」を服用される患者さまとご家族の方へ

このお薬の服用中に、体重の増加や、血糖値(血液中のブドウ糖の量)の上昇がみられることがあります。

そのため、**糖尿病の方、糖尿病といわれたことのある方**は、このお薬は服用していただけません。お心当たりのある方は、必ず、服用される前に主治医の先生もしくは薬剤師の先生に、ご相談ください。

また、**ご親族に糖尿病の方がいる方、血糖値が高いといわれたことがある方、肥満傾向の方、体重が増加してきた方**は、糖尿病になりやすい方ですので、服用される前に必ず主治医の先生もしくは薬剤師の先生に、ご相談ください。服用されている間は、**特に血糖値と体重の変化には気を付けてください。**

オランザピン錠 2.5mg「オーハラ」



オランザピン錠 5mg「オーハラ」



オランザピン錠 10mg「オーハラ」



オランザピン細粒 1%「オーハラ」

