

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」、 オロパタジン塩酸塩錠5mg「オーハラ」を

服用される患者さんへ

このお薬はアレルギー症状の原因となる物質(ヒスタミンなど)の体内での産生や遊離を抑え、また、このような物質のはたらきを妨げることにより鼻や皮膚のアレルギー症状を消失もしくは和らげます。

2.5mg 錠



表

裏

5mg 錠



表

裏

お薬の飲み方と量

- 通常、成人は1回オロパタジン塩酸塩として5mgを1日2回朝・寝る前に服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- お薬はコップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- 朝の分を飲み忘れた場合には気がついた時に(それが昼ごろまでであれば)すぐに飲んでください。それ以降は次回より飲んでください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。

お薬を飲むうえでの注意

- 眠気がおこることがありますので、自動車の運転や機械の操作は避けてください。
- 花粉症の場合は、花粉が飛ぶ季節が終わるまで毎日服用を続けることが大切です。
- 主な副作用として、眠気、けん怠感、口渇、過敏症(発疹、浮腫、かゆみ、呼吸困難)などが報告されています。

このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

製造販売元



大原薬品工業株式会社