

プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMIオールラ

プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMIオールラ

を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬を正しく服用するため、
飲む前に必ずお読みください。

必ず主治医の指示を守って飲んでください。
けっして自分の判断で飲む量を変えたり、
飲むのを止めないでください。

自動車の運転等を行わないでください。

- このお薬を飲むと、
眠くなったり、前ぶれもなく急に眠り
込んでしまうこと(突発的睡眠)、
また、めまいや立ちくらみ、
ふらつき、失神
が起ることがあります。



自動車の運転や危険を伴う機械の操作、高い場所
での作業などを行わないでください。

● **欲求や行動を抑えられなくなること
(衝動制御障害)**

このお薬はドーパミン受容体作動薬と呼ばれるグループに属するお薬です。ドーパミン受容体作動薬を飲むと、社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を持続的に繰り返したり、性欲や食欲が病的に亢進したりする衝動制御障害(病的賭博、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食等)が起こることがあります。



- **急な眠り込み、幻覚や妄想、めまいや立ちくらみ**
- **発熱や意識がぼんやりした状態**
- **筋肉のこわばりがひどい状態**

**このような症状があらわれた場合には、
すぐに医師または薬剤師に相談してください。**

この説明書に書いてあることは、特に注意して
いただきたいことです。このお薬について何か
分からないことがありましたら、主治医または
薬剤師に相談してください。