

シロドシン錠2mg,4mg「オーハラ」、 シロドシンOD錠2mg,4mg「オーハラ」を 服用される患者様へ



シロドシン錠、シロドシンOD錠「オーハラ」は、「前立腺肥大症に伴う排尿障害」を改善するお薬です。

▶服用時の注意

通常、成人にはシロドシンとして1回4mgを1日2回朝夕食後に経口服用してください。症状に応じて適宜減量されます。必ず医師の指示された服用方法に従ってください。

OD錠は水なしで服用することもできます。水なしで服用する場合は、舌の上で唾液を浸潤させ崩壊してから唾液とともに飲み込んでください。普通のお薬と同じように、水で服用することもできます。ただし、OD錠は寝たままの状態では、水なしで服用しないでください。

▶飲み忘れた場合

飲み忘れた回の服用は避けて、次の服用時間に1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲まないでください。

▶副作用について

本剤を服用すると以下のような副作用が起こることがあります。

- 射精障害(逆行性射精等)
- 口渇
- 下痢
- 軟便
- 立ちくらみ
- 鼻閉
- めまい
- ふらつき
- 頭痛













本剤を服用中にめまいなどがあらわれることがありますので、高所作業、自動車の運転など危険を伴う作業に従事する場合には十分に注意してください。

本剤を服用中に症状や体調の変化など何か気になることがありましたら、医師または薬剤師に速やかにご相談してください。

▶ 保管について

- ・直射日光は避けて室温で保管してください。
- ・乳幼児、小児の手の届かない場所に保管してください。
- ・薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。
絶対に他の人には渡さないでください。廃棄については薬局や医療機関に相談してください。

▶ 薬の剤形・1次包装について

	シロドシン錠2mg, 4mg オールパス		シロドシンOD錠2mg, 4mg オールパス	
剤形 (実物大)	 2mg	 4mg	 2mg	 4mg
1次包装	 表	 表	 表	 表
	 裏	 裏	 裏	 裏