

# トアラセット® 配合錠「オーハラ」を 服用される患者さんへ

トアラセット® 配合錠「オーハラ」には痛みをおさえる2種類の成分、トラマドール塩酸塩とアセトアミノフェンが配合されています。

また、他の薬にこれらの成分が含まれる場合もあります。薬の重複を避けるため、病院や薬局で薬をもらう時には医師・薬剤師にトアラセット® 配合錠「オーハラ」を服用していることをお伝えください。特にアセトアミノフェンはかぜ薬などの一般用医薬品に含まれている場合もありますので、十分ご注意ください。

## 服用時の注意

- 1回1錠、1日4錠が標準ですが、医師の指示通り服用してください。
- 1回2錠、1日8錠より多く服用しないでください。
- 服用間隔は4時間以上空けてください。
- 誤って多く服用した場合は、すぐに医者や薬剤師にご相談ください。
- アルコールにより副作用が出やすくなるため、飲酒は避けてください。
- 自分の判断で服用を中止しないでください。

👉 トアラセット® 配合錠「オーハラ」を服用中に症状や体調の変化など何か気になることがありましたら、医師または薬剤師に速やかにご相談ください。

## 保管について

- 乳幼児、子供の手が届かない場所に保管してください。
- 薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。
- 他の人には絶対に渡さないでください。

## 副作用について

### 【便秘】

本剤の飲み始めにあらわれることがあります。

対策として緩下剤を併用していただくことがあります。

### 【悪心・嘔吐】

本剤の飲み始めにあらわれることがあります。

1～2週間で症状がなくなることが多いですが、治まらない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

対策として、制吐剤を併用していただくことがあります。

### 【眠気】

本剤の飲み始めにあらわれることがあります。

3～5日でなくなることが多いですが、治まらない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

本剤を服薬中は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。

