

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

2019年1月  
大原薬品工業株式会社  
安全管理部

パーキンソニズム治療剤  
処方箋医薬品<sup>注1)</sup>

**ドパストン<sup>®</sup> 静注25mg**

**ドパストン<sup>®</sup> 静注50mg**

**DOPASTON<sup>®</sup> FOR INTRAVENOUS USE 25mg**

**DOPASTON<sup>®</sup> FOR INTRAVENOUS USE 50mg**

(レボドパ注射液)

**ドパストン<sup>®</sup> カプセル250mg**

**ドパストン<sup>®</sup> 散98.5%**

**DOPASTON<sup>®</sup> CAPSULES 250mg**

**DOPASTON<sup>®</sup> POWDER 98.5%**

(レボドパ製剤)

注1) 注意一医師等の処方箋により使用すること

この度、弊社製品『ドパストン静注25mg・50mg、カプセル250mg、散98.5%』の【使用上の注意】を改訂いたしますので、お知らせ申し上げます。今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

### 1. 改訂内容（改訂項目のみ抜粋）〔    部：追記箇所・部：削除箇所（自主改訂）〕

改訂後	改訂前
<p><b>【禁忌】</b>(次の患者には投与しないこと) (1)、(2) &lt;略：現行どおり&gt;</p> <p><b>【使用上の注意】</b> 2. 重要な基本的注意 (1)～(4) &lt;略：現行どおり&gt; (5) セレギリン塩酸塩等（B型モノアミン酸化酵素阻害剤）との併用に際しては、使用前に必ずセレギリン塩酸塩等の添付文書を参照すること。 (6) &lt;略：現行どおり&gt;</p>	<p><b>【禁忌】</b>(次の患者には投与しないこと) (1)、(2) &lt;略&gt; <del>(3) 非選択的モノアミン酸化酵素阻害剤投与中の患者（「2. 重要な基本的注意」、「3. 相互作用」の項参照）</del></p> <p><b>【使用上の注意】</b> 2. 重要な基本的注意 (1)～(4) &lt;略&gt; (5) セレギリン塩酸塩（B型モノアミン酸化酵素阻害剤）との併用に際しては、使用前に必ずセレギリン塩酸塩の添付文書を参照すること。 (6) &lt;略&gt;</p>

