

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2021年11月  
大原薬品工業株式会社  
安全管理部

アンジオテンシン変換酵素阻害剤

処方箋医薬品<sup>注)</sup>

日本薬局方 リシノプリル錠

**リシノプリル錠5mg「オーハラ」**

**リシノプリル錠10mg「オーハラ」**

**リシノプリル錠20mg「オーハラ」**

**LISINOPRIL TABLETS 5mg「OHARA」**

**LISINOPRIL TABLETS 10mg「OHARA」**

**LISINOPRIL TABLETS 20mg「OHARA」**

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

この度、弊社製品『リシノプリル錠 5mg・10mg・20mg 「オーハラ」』の【使用上の注意】を改訂いたしますので、お知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（改訂項目のみ抜粋）〔 \_\_\_部：追記箇所（自主改訂）〕

改訂後	改訂前
<p><b>【禁忌】（次の患者には投与しないこと）</b></p> <p>(1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>(2) <u>サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物を投与中の患者又は投与中止から 36 時間以内の患者（「3. 相互作用」の項参照）</u></p> <p>(3)～(7) 以下順送り</p>	<p><b>【禁忌】（次の患者には投与しないこと）</b></p> <p>(1)～(6) 略</p>

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 (1) 併用禁忌（併用しないこと）			【使用上の注意】 3. 相互作用 (1) 併用禁忌（併用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
サクビト ril バ ルサルタンナト リウム水和物 エンレスト	血管浮腫があらわれ るおそれがある。 左記薬剤が投与さ れている場合は、少 なくとも本剤投与 開始36時間前に中 止すること。また、 本剤投与終了後に 左記薬剤を投与す る場合は、本剤の最 終投与から36時間 後までは投与しな いこと。	併用により相加 的にブラジキニ ンの分解を抑制 し、血管浮腫の リスクを増加さ せる可能性があ る。	<略>		
<略：現行どおり>					
アリスキレンフ マル酸塩 ラジレス	非致死性脳卒中、 腎機能障害、高カ リウム血症及び低 血圧を発現するリ スクが増加するこ とがある。	併用によりレニ ン・アンジオテ ンシン系阻害作 用が増強される 可能性がある。 危険因子：アリ スキレンフマル 酸塩を投与中の 糖尿病患者（た だし、他の降圧 治療を行っても なお血圧のコン トロールが著し く不良の患者を 除く）			


## 2. 改訂理由

先発製剤の改訂に伴い、本剤においても同様の記載をいたします。

☆ 改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行「DSU 医薬品安全対策情報 No.304」に掲載されます。改訂後の添付文書全文につきましては、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ」(<https://www.pmda.go.jp>) 並びに弊社ホームページ (<https://www.ohara-ch.co.jp>) をご参照ください。

リシノプリル錠 5mg 「オーハラ」の GS1 コード



 製造販売元 **大原薬品工業株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野121-15

### 【お問い合わせ先】

大原薬品工業株式会社 お客様相談室  
〒104-6591 東京都中央区明石町 8-1 聖路加タワー36階  
TEL 0120-419-363 FAX 03-6740-7703