








製品別比較表(案)

		後 発 品	標 準 品		
会 社 名	大原薬品工業株式会社				
商 品 名	ベニジピン塩酸塩錠8mg「OME」 (日本薬局方 ベニジピン塩酸塩錠)		コニール錠8 (日本薬局方 ベニジピン塩酸塩錠)		
薬 価	18.90 円/錠		35.50 円/錠		
薬 剤 料 の 差	16.60円				
コ ー ド No. *)	2171021F3019		—		
成 分 名	ベニジピン塩酸塩				
規 格	1錠中に日局ベニジピン塩酸塩8mgを含有				
添 加 物	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール4000、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ		黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、パレイシヨデンプン、ヒプロメロース(置換度タイプ:2910)、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、マクロゴール6000		
薬 効 分 類 名	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗薬)				
効 能 ・ 効 果	標準品と同じ	<input type="checkbox"/> 高血圧症、腎実質性高血圧症 <input type="checkbox"/> 狭心症			
用 法 ・ 用 量	標準品と同じ	<高血圧症、腎実質性高血圧症> 通常、成人にはベニジピン塩酸塩として1日1回2~4mgを朝食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、効果不十分な場合には、1日1回8mgまで増量することができる。ただし、重症高血圧症には1日1回4~8mgを朝食後経口投与する。 <狭心症> 通常、成人にはベニジピン塩酸塩として1回4mgを1日2回朝・夕食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。			
製 品 の 性 状		表面	裏面	側面	識別表示
		直径(mm)	質量(mg)	厚さ(mm)	
	ベニジピン塩酸塩錠8mg「OME」				OH274
	黄色・割線入りフィルムコーティング錠	8.6	248.0	3.9	
コニール錠8					
黄色・フィルムコーティング錠	8.1	0.20g	3.8		
品 質 再 評 価	本剤は品質再評価公示後に公的溶出試験規格を設定して承認された品目である。(医療用医薬品品質情報集<オレンジブック>総合版)				
公 的 溶 出 試 験	日本薬局方ベニジピン塩酸塩錠に従い試験するとき、45分間の溶出率が85%以上であった。				
標 準 品 と の 性 同	溶出試験(試験液:pH1.2/50rpm)		生物学的同等性		
	 <p>「含量が異なる経口固形剤の生物学的同等性試験ガイドライン」の溶出試験の項に基づき、両剤の溶出挙動は同等であると判定された。</p>		<p>本剤は「含量が異なる経口固形剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に従い、ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」を標準剤としたとき、溶出挙動は同等であると判定され、その結果、ベニジピン塩酸塩錠8mg「OME」とベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」は生物学的に同等であるとみなされた。</p>		
安 定 性 (加 速)	40°C±1°C、75%RH±5%RH、6ヶ月(性状、確認試験、純度試験、含量均一性試験、溶出試験、定量)			適合	
安 定 性 (無 包 装)	加湿[25°C、60%RH、2週間(遮光、開放)]		性状、溶出試験 定量、硬度	全て変化なし。	
	曝光[総照射量:60万lx・hr(開放)]			全て変化なし。	
備 考					
担 当 者 、 連 絡 先					

*:薬価基準収載医薬品コード

①、②

2025.4