



製品別比較表(案)

| | 後発品 | 標準品 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|--|----|----|----|------|--------|--------|--------|
| 会社名 | 大原薬品工業株式会社 | | | | | | | | | | | |
| 商品名 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | パリエット錠10mg | | | | | | | | | | |
| 薬価 | 24.00 円/錠 | 35.80 円/錠 | | | | | | | | | | |
| 薬剤料の差 | 11.80円 | | | | | | | | | | | |
| コードNo.* | 2329028F1147 | — | | | | | | | | | | |
| 成分名 | ラベプラゾールナトリウム | | | | | | | | | | | |
| 規格 | 1錠中日局ラベプラゾールナトリウム10mgを含有 | | | | | | | | | | | |
| 添加物 | D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、水酸化ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、タルク、ポリビニルアルコール/アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、メタクリル酸コポリマー-LD、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリソルベート80、クエン酸トリエチル、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ | エチルセルロース、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ、カルメロースカルシウム、グリセリン脂肪酸エステル、酸化チタン、酸化マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、D-マンニトール | | | | | | | | | | |
| 薬効分類名 | プロトンポンプ阻害剤 | | | | | | | | | | | |
| 効能・効果 | 標準品と同じ ○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群、非びらん性胃食道逆流症、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制 ○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、免疫性血小板減少症、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 | | | | | | | | | | | |
| 用法・用量 | 標準品と同じ <胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison症候群> 通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1回10mgを1日1回経口投与するが、病状により1回20mgを1日1回経口投与することができる。なお、通常、胃潰瘍、吻合部潰瘍では8週間まで、十二指腸潰瘍では6週間までの投与とする。 <逆流性食道炎> ・治療：逆流性食道炎の治療においては、通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1回10mgを1日1回経口投与するが、病状により1回20mgを1日1回経口投与することができる。なお、通常、8週間までの投与とする。また、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合、1回10mg又は1回20mgを1日2回、さらに8週間経口投与することができる。ただし、1回20mg1日2回投与は重度の粘膜傷害を有する場合に限る。 ・維持療法：再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては、通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1回10mgを1日1回経口投与する。また、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な逆流性食道炎の維持療法においては、1回10mgを1日2回経口投与することができる。 <非びらん性胃食道逆流症> 通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1回10mgを1日1回経口投与する。なお、通常、4週間までの投与とする。 <低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制> 通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1回5mgを1日1回経口投与するが、効果不十分の場合は1回10mgを1日1回経口投与することができる。 <ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助> 通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1回10mg、アモキシリン水和物として1回750mg(力価)及びクラリスロマイシンとして1回200mg(力価)の3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜增量することが出来る。ただし、1回400mg(力価)1日2回を上限とする。 プロトンポンプインヒビター、アモキシリン水和物及びクラリスロマイシンの3剤投与によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合は、これに代わる治療として、通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1回10mg、アモキシリン水和物として1回750mg(力価)及びエトロニダグリルとして1回250mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。 | | | | | | | | | | | |
| 製品の性状 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>表面</th> <th>裏面</th> <th>側面</th> <th rowspan="2">識別表示</th> </tr> <tr> <th>直径(mm)</th> <th>質量(mg)</th> <th>厚さ(mm)</th> </tr> </table> | | | | | 表面 | 裏面 | 側面 | 識別表示 | 直径(mm) | 質量(mg) | 厚さ(mm) |
| | 表面 | 裏面 | 側面 | 識別表示 | | | | | | | | |
| | 直径(mm) | 質量(mg) | 厚さ(mm) | | | | | | | | | |
| ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 淡黄色・フィルムコーティング錠(腸溶錠) |  10 mm |  10 mm |  | ラベプラ 10 オーハラ | | | | | | | | |
| パリエット錠10mg 淡黄色・フィルムコーティング錠(腸溶錠) |  |  |  | | | | | | | | | |
| 品質再評価 | 品質再評価に指定されていない。 | | | | | | | | | | | |
| 公的溶出試験 | 公的溶出試験規格が設定されていない。 | | | | | | | | | | | |
| 標準品との同等性 | <p>溶出試験(試験液:pH6.8/50rpm)</p>  <p>後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに基づき、両製剤の溶出挙動は類似していると判定された(詳細は備考欄)。</p> | | <p>生物学的同等性</p>  <p>後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに基づき、両製剤は生物学的に同等であると判定された。</p> | | | | | | | | | |
| 安定性(加速) | 40°C±1°C、75%RH±5%RH、6ヶ月(性状、確認試験、純度試験、含量均一性試験、崩壊試験、定量) | | 適合 | | | | | | | | | |
| 安定性(無包装) | 加温[40°C、3ヶ月(遮光、気密容器)] | 性状、純度試験、崩壊試験、定量、硬度 | 類縁物質増加(規格内)。その他は変化なし。 | | | | | | | | | |
| | 加湿[25°C、75%RH、1ヶ月(遮光、開放)] | | 類縁物質増加(規格内)及び硬度低下(規格内)。その他は変化なし。 | | | | | | | | | |
| | 加湿[25°C、75%RH、3ヶ月(遮光、開放)] | | 類縁物質増加(規格外)及び硬度低下(規格内)。その他は変化なし。 | | | | | | | | | |
| | 曝露[総照射量:120万lx·hr(開放/25°C、60%RH)] | | 全て変化なし。 | | | | | | | | | |
| 備考 | pH1.2及びpH6.0(いずれも50rpm)並びにpH6.0(100rpm)においても、両製剤の溶出挙動は類似していると判定された。 | | | | | | | | | | | |
| 担当者、連絡先 | | | (2)(3) | | | | | | | | | |

*:薬価基準収載医薬品コード

2025.8