



# 製品別比較表(案)

		後 発 品	標 準 品		
会 社 名	大原薬品工業株式会社				
商 品 名	シロドシンOD錠4mg「オーハラ」 (日本薬局方 シロドシン口腔内崩壊錠)		ユリーフOD錠4mg (日本薬局方 シロドシン口腔内崩壊錠)		
薬 価	13.20 円/錠		28.90 円/錠		
薬 剤 料 の 差	15.70円				
コ ー ド No.*)	2590010F4103		—		
成 分 名	シロドシン				
規 格	1錠中日局シロドシン4mgを含有				
添 加 物	D-マンニトール、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、クロスボビドン、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、炭酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク、スクラロース、アミノアルキルメタクリレートコポリマー-E、ステアリン酸、ラウリル硫酸ナトリウム、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、トメントール		ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、フマル酸ステアリルナトリウム、ステアリン酸、タルク、D-マンニトール、ラウリル硫酸ナトリウム、結晶セルロース、アミノアルキルメタクリレートコポリマー-E、クロスボビドン、部分アルファー化デンプン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、スクラロース、香料、アラビアガム、乳糖、プロピレングリコール		
薬 効 分 類 名	選択的 $\alpha_{1A}$ 遮断薬/前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬				
効 能・効 果	標準品と同じ	前立腺肥大症に伴う排尿障害			
用 法・用 量	標準品と同じ	通常、成人にはシロドシンとして1回4mgを1日2回朝夕食後に経口投与する。なお、症状に応じて適宜減量する。			
製 品 の 性 状		表面 直径(mm)	裏面 質量(mg)	側面 厚さ(mm)	識別表示
	シロドシンOD錠4mg「オーハラ」 淡黄赤色・割線入り素錠(口腔内崩壊錠)				
	ユリーフOD錠4mg 淡黄赤色・素錠・割線入り				
		8.0	約200	約3.8	
品質再評価	品質再評価に指定されていない。				
公的溶出試験	公的溶出試験規格が設定されていない。				
標 準 品 と の 性 質	溶出試験(試験液:pH1.2/50rpm)		生物学的同等性		
	 <p>「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき両剤の溶出挙動は類似していると判定された(詳細は備考欄)。</p>		 <p>「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、両剤は生物学的に同等であると判定された。</p>		
安 定 性 ( 加 速 )	40°C±1°C、75%RH±5%RH、6ヶ月(性状、確認試験、純度試験(類縁物質)、含量均一性試験、崩壊試験、溶出試験、定量)			適合	
安 定 性 ( 無 包 装 )	加温[40°C、3ヵ月(遮光、気密容器)]		性状、純度試験、崩壊試験、溶出試験、定量、硬度	類縁物質増加(規格内)。その他は変化なし。	
	加湿[25°C、75%RH、3ヵ月(遮光、開放)]			類縁物質増加(規格内)。その他は変化なし。	
	曝光[総照射量:60万lx・hr(開放/25°C、60%RH)]			類縁物質増加(規格内)。その他は変化なし。	
	曝光[総照射量:120万lx・hr(開放/25°C、60%RH)]			類縁物質増加(規格外)。その他は変化なし。	
備 考	pH4.0、pH6.8及び水(いずれも50rpm)においても、両剤の溶出挙動は類似していると判定された。				
担 当 者、連 絡 先					

\*:薬価基準収載医薬品コード